

ขั้นตอนการดำเนินการวัคซีน นิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
(Flow chart of providing student nursing obligated vaccination)

รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
ประชุมร่วมกับศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อกำหนดวัน เวลาการฉีดวัคซีนให้นิสิต	1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ พัฒนานิสิตและวัฒนธรรม 2. เจ้าหน้าที่พัฒนานิสิตฯ คณะพยาบาลศาสตร์ 3. เจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์แบบองค์รวมฯ	ก่อนเปิด ภาคการศึกษาที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฉีดวัคซีน ไปยัง ศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม มหาวิทยาลัยทักษิณ	1. เจ้าหน้าที่พัฒนานิสิตฯ คณะพยาบาลศาสตร์	ก่อนเปิด ภาคการศึกษาที่ 1
งานพัฒนานิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ แจงข้อมูลตาราง วัน เวลาฉีดวัคซีน และราคาค่าวัคซีน ให้นิสิตทราบ	1. เจ้าหน้าที่พัฒนานิสิตฯ คณะพยาบาลศาสตร์	ก่อนวันฉีดวัคซีน อย่างน้อย 1 เดือน
ตัวแทนนิสิต ชำระค่าวัคซีนที่ช่องการเงิน ศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม มหาวิทยาลัยทักษิณ/ หรือโรงพยาบาลที่กำหนด	ตัวแทนนิสิต	วันที่ฉีดวัคซีน
นิสิตเข้ารับการฉีดวัคซีนที่กำหนด ณ คลินิกปฐมภูมิ/ ศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม มหาวิทยาลัยทักษิณ/ หรือโรงพยาบาลที่กำหนด	นิสิตพยาบาล ทุกคน	ตามกำหนด วันที่ฉีดวัคซีน ของแต่ละชั้นปี
นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 ทุกคน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบอหิวาต์ เชื้อที่ 1	นิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ทุกคน	ภาคการศึกษาที่ 2

รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;">           นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบ            เชื้อดัดอักเสบบี และภูมิคุ้มกันโรคดัดอักเสบบี            และภูมิคุ้มกันโรคสுகไส         </div>	นิสิตพยาบาล ชั้นปีที่ 1 ทุกคน	ภาคการศึกษาที่ 2 4-6 สัปดาห์ ภายหลังฉีดวัคซีน ป้องกันโรคดัด อักเสบบี เข็มที่ 1
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> <span style="font-size: 24px;">❖</span> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">             ไม่มีภูมิคุ้มกัน              โรคดัดอักเสบบี           </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">             ฉีดวัคซีนป้องกัน              โรคดัดอักเสบบี              อีก 2 เข็ม           </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;">             ตรวจภูมิคุ้มกัน              โรคดัดอักเสบบี           </div> </div>	นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 ที่ผลภูมิคุ้มกัน เป็นลบ	ภาคการศึกษาที่ 2 - เข็มที่ 2: ฉีด ภายหลังทราบผล ว่าเป็นลบ - เข็มที่ 3: 6 เดือน หลังฉีดวัคซีนดัด อักเสบบี เข็ม 1 - ตรวจภูมิ: 1 เดือน หลังฉีดวัคซีนดัด อักเสบบี เข็ม 3
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;"> <span style="font-size: 24px;">❖</span> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">             ไม่มีภูมิคุ้มกัน              โรคสுகไส           </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">             ฉีดวัคซีนป้องกัน              โรคสுகไส 2 เข็ม           </div> </div>	นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 ที่ผลภูมิคุ้มกัน เป็นลบ	ภาคการศึกษาที่ 2 - เข็มที่ 1: ฉีด ภายหลังทราบผล ว่าเป็นลบ - เข็มที่ 2: ฉีด 1 เดือน หลังฉีดวัคซีน สุกไสเข็ม 1
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;">           นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 ทุกคน            - เข็มที่ 1 วัคซีนหัด หัดเยอรมัน 1 เข็ม            - เข็มที่ 2 วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน 1 เข็ม         </div>		ภาคการศึกษาที่ 2 - เข็ม 1 และ 2 ห่างกัน 1 เดือน
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;">           นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 ทุกคน ที่ได้รับวัคซีนครบ            มีภูมิคุ้มกันโรคดัดอักเสบบี สุกไสและหัด คางทูม หัดเยอรมัน         </div>	นิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 1 ทุกคน	ก่อนเปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2

รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>นิติตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ทุกคนฉีด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (dT/Tdap)</li> <li>- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่</li> </ul> </div>	<p>นิติตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ทุกคน</p>	<p>ภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 1 หรือ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 (ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2)</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>นิติตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ทุกคน ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)</p> </div>	<p>นิติตพยาบาลชั้นปีที่ 2 ทุกคน</p>	<p>ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 ไม่เกิน 6 เดือน (หรือตามที่แหล่งฝึก กำหนด)</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>นิติตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้วัดใหญ่และถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)</p> </div>	<p>นิติตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ทุกคน</p>	<p>ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3 ไม่เกิน 6 เดือน (หรือตามที่แหล่งฝึก กำหนด)</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>นิติตพยาบาลชั้นปีที่ 4 ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้วัดใหญ่และถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)</p> </div>	<p>นิติตพยาบาลชั้นปีที่ 4 ทุกคน</p>	<p>ก่อนฝึกภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 ไม่เกิน 6 เดือน (หรือตามที่แหล่งฝึก กำหนด)</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>สิ้นสุด</p> </div>		

\* ในกรณีที่มีประวัติการป่วยโรคฉี่หนูหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง การตรวจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และ  
พยาบาลคลินิกปฐมภูมิ